

Folgen des Wetters

Die Situation auf den Feldern ist herausfordernd bis traurig. Das Landwirtschaftsamt ist am Abklären diverser Fragen wegen der Ernte und den Beiträgen und wird bis spätestens Mitte nächster Woche hier einige Infos bringen.

Sofern wie erhofft nächste Woche Gerstenfelder geerntet werden können, sollten schon vor dem Dreschen die Menge der ausgefallenen Körner begutachtet werden. Sind es nämlich viele, so empfiehlt es sich, eine oberflächliche Stoppelbearbeitung vorzunehmen, um die Ausfallgerste zum Keimen anzuregen. In einem zweiten Durchgang kann sie dann beseitigt werden. So wird Durchwuchs vermindert. Raps als Lichtkeimer hingegen darf keinesfalls vergraben werden und muss zuerst auflaufen, bevor die Stoppeln bearbeitet werden können.

Este Cercospora-Flecken gefunden

Der auf Blattresten überwinternde Pilz braucht eine bestimmte Temperatursumme, bis erste Sporen gebildet werden. Da es seit April kälter war als in den vergangenen Jahren, sind die ersten Flecken erst jetzt aufgetaucht. Die Infektion wird sich rasch ausbreiten, sobald die Temperaturen über 25°C steigen. Flecken sind im Moment dort zu erwarten, wo die Rübendichte hoch ist, im letzten Jahr Rüben auf der Nachbarparzelle standen oder der Rübenhaufen in der Nähe war. Deshalb sollte man mit den Kontrollen dort beginnen. Cercospora-Blattflecken haben einen braun-roten Rand, Ramularia-Flecken einen helleren. Pseudomonas/Bakterien-Flecken haben meist einen dunklen Rand. Bei Nässe scheinen leider alle Ränder dunkel sind, weshalb man die Blätter etwa eine Stunde trocknen lassen sollte. Im Innern von Cercosporaflecken sind schwarze, kleine Punkte sichtbar. Die Bekämpfungsschwelle liegt bei einer bis zwei Pflanzen pro Are mit Befall oder einem grösseren Befallsherd im Bestand. Wird bei der Fungizidbehandlung Kupfer zugemischt, ist zu bedenken, dass dieser bei Regen schnell abgewaschen wird und es vorteilhafter ist, Kupfer nach dem Regen vor einer mehrtägigen, regenfreien Phase einzusetzen. Wo Flecken gefunden wurden, könnte sich je nach Befahrbarkeit also der Dienstag für eine Behandlung eignen.

16. Juli 2021, Lena Heinzer



Cercospora (leicht vergrößert), mit den schwarzen Sporen in Innern (Lena Heinzer)



Unförmige Flecken verursacht durch Pseudomonas-Bakterien (Lena Heinzer)